

# ДЕСНЕВАЯ ПЛАСТИКА



от 27 500



от 30 минут

Собственные зубы и имплантат должны быть полностью окружены десной. Недостаток десны вызывает ее дальнейшую убыль и формирует «карманы», в которых скапливаются остатки пищи. Это провоцирует воспаление, подвижность зубов и повышает риски их утраты.

Пластика (наращивание) десны необходима перед установкой имплантата: отсутствие жевательной нагрузки после удаления или потери зуба приводит к значительному уменьшению объема десны.

Пластика десны необходима при оголении корней зубов: при так называемой рецессии десны. Рецессия вызывает повышенную чувствительность корней, кариес корня, разрушение прикорневой зоны (клиновидный дефект) и просто смотрится эстетически непривлекательной..



В своей работе мы используем только современные малотравматичные микрохирургические методики. Это сверхточные разрезы и тончайший шовный материал. Все манипуляции выполняем с использованием микроскопа или особых увеличивающих «очков» — бинокуляров.

Ту или иную методику подбираем индивидуально под биотип пациента. Используем современную инъекционную анестезию — вся процедура проходит без боли.

Забираем трансплантат в области неба или за последними жевательными зубами.



**ДО ЛЕЧЕНИЯ**

Для «закрытия рецессий» отдаем предпочтение атравматичному туннельному методу, который не требует отслойки десны. Снимаем швы на 7 день после трансплантации при стандартном сроке — 14 дней.

Наши пациенты не жалуются на боль: заживление после пластики десен проходит комфортно и не требует приема обезболивающих.

Наши хирурги регулярно повышают квалификацию у западных коллег и являются действительными членами ITI — влиятельной международной группы имплантологов, лечебные рекомендации которых основываются на клинических исследованиях.



**ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ**